

## Summary of findings (SoF) tabell

Resultat-tabell som viser kvaliteten på dokumentasjonen på tvers av utfallsmål

**PICO-spørsmål:** Er NOAK bedre eller like gode som warfarin hos pasienter med atrieflimmer og iskemisk hjerneslag?

Kilde: Liu, G. J., Wang, Y. F., Chen, P. Y., Chang, W., Tu, M. L., Chang, L. Y., . . . Luo, J. (2014). The efficacy and safety of novel oral anticoagulants for the preventive treatment in atrial fibrillation patients: A systematic review and meta-analysis. *Drug Delivery*, 21(6), 436-452.

Utfall	Relativ effekt (Konfidensintervall, KI) [deltakere, studier, oppfølging]	Forventet absolutt forskjell		Tiltro til estimatene
		[kontroll]	[intervensjon]	
<b>1. Hjerneslag<sup>1</sup> eller systemisk embolisme<sup>2</sup></b>	<b>OR 0.72</b> (KI 0.52, 0.99)  Basert på data fra 15 294 deltakere i 4 RCT-studier over 1.1 – 2 år.	-- per 1000  Forskjell i risiko med intervensjon:	-- per 1000  -- per 1000 (KI)	<b>Moderat</b> Høy heterogenitet mellom studiene  ⊕⊕⊕○
<b>2. Alvorlige blødninger (major bleedings)<sup>3</sup></b>	<b>OR 0.88</b> (KI 0.76, 1.01)  Basert på data fra 15 277 deltakere i 4 RCT-studier over 1.1 – 2 år.	-- per 1000  Forskjell i risiko med intervensjon:	-- per 1000  -- per 1000 (KI)	<b>Moderat</b> Redusert overførbarhet  ⊕⊕⊕○

<sup>1</sup> Hjerneslag ble definert som iskemisk slag, hjerneblødning og TIA.

<sup>2</sup> Systemisk embolisme ble definert som akutt arteriell vaskulær okklusjon i ekstremiteter eller organer.

<sup>3</sup> Store blødninger ble definert ved fall  $\geq 2$  g/dL hemoglobin innen 24 timer, behov for  $\geq 2$  enheter med blod/rød celle overføring eller intrakraniell blødning, «hematorrhacis», intra-okkulær blødning (ekskludert konjunktival blødning), perikard blødning, intra-«joint» blødning, retroperitoneal blødning eller «osteofascial compartment» syndrom ved injeksjonssted eller fatale blødninger.